Notice d'information sur le produit

NeoMycolog

Gel

Tubes de 15 grammes
Dispositif médical

1. QU'EST-CE QUE NEOMYCOLOG?

NeoMycolog est recommandé pour le traitement des plaies superficielles et des lésions infectées cutanées.

NeoMycolog est un gel composé d'huile d'olive ozonée. Lorsque le gel entre en contact avec les fluides de la plaie/l'eau, des ozonides sont libérés. Ces ozonides créent un environnement acide oxydant hostile aux micro-organismes comme les bactéries, les levures et les mycoses.

2. PRECAUTIONS

Patients présentant une sensibilité connue au gel ou à l'un de ses principes actifs

N'utiliser le gel que sur des plaies superficielles ou des lésions infectées cutanées sur une petite surface. Ne pas utiliser sur les yeux ou sur les muqueuses.

En fonction de la pathologie sous-jacente, la prise en charge d'une plaie doit toujours s'accompagner d'un traitement médical de support approprié et d'une surveillance. **NeoMycolog** créé un environnement humide oxydant au niveau de la plaie qui stimule le débridement et l'élimination du tissu nécrotique infecté. Il se peut donc que la surface de la plaie s'agrandisse légèrement au début du traitement.

Grossesse et allaitement

Il n'existe aucune information concernant l'utilisation de **NeoMycolog** pendant la grossesse ou l'allaitement. Vous êtes enceinte ou vous allaitez ? Contactez votre médecin ou votre pharmacien.

3. MODE D'EMPLOI

NeoMycolog doit toujours être utilisé conformément aux consignes du médecin ou du pharmacien ou à la présente notice. Vous avez des doutes sur son utilisation correcte ? Contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Utilisation sur des lésions infectées cutanées ou des plaies que l'on ne souhaite pas cacher

Appliquer 1 à 3 fois par jour sur la peau affectée.

Utilisation sur des lésions infectées cutanées ou des plaies que l'on souhaite cacher

1. En cas d'application sur une plaie, nettoyer d'abord la plaie
2. Ouvrir le tube
3. Appliquer le gel directement sur/dans la plaie sans laisser le gel déborder de la plaie
4. Couvrir le gel/la plaie d'un pansement qui retient l'humidité

NeoMycolog doit être changé en cas de fuite du pansement recouvrant la plaie ou de retrait du pansement. Le gel peut être rincé avec une solution saline stérile. La fréquence de changement du pansement dépendra de l'exsudat produit par la plaie, tous les 2 à 7 jours en moyenne.

4. CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver entre 5 - 25 °C; éviter la congélation.

5. EMBALLAGE

Gel, usage externe, application sur la peau.
Odeur d'ozone puissante typique.
Tube de 15 g.

6. INGREDIENTS

100 % huile d'olive ozonée
Pas de conservateurs
NeoMycolog est un dispositif médical de classe IIa.

▶ **Fabricant**
SanoMed Manufacturing BV
Smoutweg 4-008
NL 4524 EK Sluis

▶ **Titulaire de licence excl.**
Oystershell NV
Booiebos 24
B9031 Drongen

▶ **Distributeur pour la Belgique**
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem

▶ **Dernière mise à jour de la notice :**
Août 2014

SANOFI CONSUMER HEALTH CARE